

Vorsorge- und Impfplan

Für

3. bis 10. Lebenstag	U2 (mit Neugeborenen-Screening) - erfolgt i.d.R. in Geburtsklinik
4. bis 5. Lebenswoche	U3 mit Hüftschall
ab der 9. Lebenswoche	1. 6-fach-Impfung (<i>Infanrix hexa</i>) plus 1. Pneumokokken-Impfung (<i>Prevenar13</i>) plus 1. Rotaviren-Schluckimpfung (<i>Rotarix</i>)
3. bis 4. Lebensmonat	U4 und 2. Rotaviren-Schluckimpfung (<i>Rotarix</i>)
<i>4 Wochen später</i>	2.6-fach-Impfung (<i>Infanrix hexa</i>) plus 2. Pneumokokken-Impfung (<i>Prevenar 13</i>)
6. bis 7. Lebensmonat	U5
um den 1. Geburtstag	U6 und 1. MMR-Impfung (<i>Priorix</i>) plus 1. Varizellen-Impfung (<i>Varivax</i>)
<i>4 Wochen später</i>	Meningokokken-C-Impfung (<i>NeisVac</i>)
<i>4 Wochen später</i>	3. 6-fach-Impfung (<i>Infanrix hexa</i>) und 3. Pneumokokken-Impfung (<i>Prevenar13</i>)
ab dem 15. Lebensmonat	2. MMRV-Impfung (<i>ProQuad / Priorix tetra</i>)
um den 2. Geburtstag	U7
um den 3. Geburtstag	U7a (mit Sehtest)
um den 4. Geburtstag	U8 (mit Hör-, Sehtest und Urindiagnostik)
um den 5. Geburtstag	U9 (mit Seh- und Sprachtest; ggf. Hörtest)
mit 6 Jahren	1. TdPa-Auffrisch-Impfung (<i>Boostrix</i>) und Einschulungsuntersuchung durch das Gesundheitsamt
mit 8 Jahren	U10
mit 10 Jahren	U11
zwischen 11-14 Jahren	2. TdPa-IPV-Auffrisch-Impfung (<i>Boostrix-Polio / Repevax</i>) und vor dem 14. Geburtstag 1. HPV-Impfung (<i>Gardasil 9</i>)
6 Monate nach 1. HPV	2. HPV-Impfung (<i>Gardasil 9</i>)
mit 13 bis 14 Jahren	Jugenduntersuchung (J1)
mit 16 bis 17 Jahren	Jugenduntersuchung (J2)

Legende: MMRV (Masern, Mumps, Röteln, Windpocken), HPV (Humane Papillomviren) und TdPA-IPV (Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Poliomyelitis)

Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin und bringen Sie den Impfpass und das Kinder- Untersuchungsheft mit. Vielen Dank!

